

**LEVANTAMENTO DAS COLETAS DE PAPANICOLAOU DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO, SEGUNDO OS RESULTADOS, ANO DE 2015**

FILHO, Nelson Prodossimo (autor) – UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga.  
ESTEVEES, Eder Joaquim (autor) – UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga.  
LOPES, Luanne Souza Oliveira (autora) – UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga.  
DIAS, Maria Aparecida do Carmo (orientadora) – UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga.

Introdução: O câncer de colo de útero ainda representa um sério problema de saúde pública, sendo o terceiro tumor mais incidente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, só perdendo para o câncer de mama e do colo retal. Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora localizada do câncer, chamada in situ. A estimativa de novos casos para o ano de 2016 é de 19.340. O número de mortes por essa causa foi de 5.430 em 2013, conforme o Sistema de Informações sobre Mortalidade. A prevenção do câncer de colo de útero requer diagnóstico precoce, por isso é preciso incentivar as mulheres, principalmente as mais vulneráveis, a comparecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e implementar os sistemas de referência caso necessite de encaminhamento. Objetivo: levantar os exames de papanicolaou do ano de 2015, tais como número, faixa etária e resultados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e retrospectiva. Os dados foram coletados do livro de registro da unidade, após consentimento da gerente da unidade, em abril de 2016. Resultados: No ano de 2015 foram coletados 297 exames de papanicolaou. Quanto a faixa etária, duas mulheres tinham até 14 anos, 48 tinham de 15 a 24 anos, 223 tinham de 25 a 65 anos e 24 acima de 65 anos. Com relação aos resultados do exame de papanicolou, quatro mulheres apresentaram Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado (ASCUS) e uma mulher apresentou Lesão Intraepitelial de Baixo Grau, com resultado de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC I). Vale ressaltar que essas alterações pode ser precursoras de câncer de colo. Conclusão: Embora a grande maioria apresentou resultado normal é de suma importância a coleta anual

do Papanicolaou como rastreamento do câncer de colo de útero e a oportunidade de tratar as anormalidades.